

## Supplement-Tabelle: Non-Response-Analyse

Merkmale †	Response-Gruppe der 26-Wochen- Nachbefragung (n = 518)	Non-Response- Gruppe (n = 1275)	p-Wert
Alter (M ± SD)	52,7 ± 14,1	44,0 ± 15,8	p < ,001 ‡
Geschlecht			
männlich	40,0 (207)	50,2 (640)	p < ,001 #
weiblich	60,0 (311)	49,8 (635)	
Bildungsniveau <sup>a</sup>			
niedrig	36,9 (191)	35,9 (458)	p = ,191 #
mittel	40,0 (207)	44,1 (562)	
hoch	23,2 (120)	20,0 (255)	
EQ-5D-5L Index <sup>b</sup> (M ± SD)	0,8 ± 0,2	0,8 ± 0,3	p = ,072 ‡
EQ-VAS <sup>b</sup> (M ± SD)	66,1 ± 20,7	65,1 ± 21,7	p = ,361 ‡
Tabakkonsummenge <sup>c</sup> (M ± SD)	14,3 ± 10,2	14,0 ± 9,9	p = ,555 ‡
Häufigkeit des Rauchverlangens <sup>d</sup> (M ± SD)	2,1 ± 1,5	1,9 ± 1,5	p = ,028 ‡
Stärke des Rauchverlangens <sup>d</sup> (M ± SD)	1,6 ± 1,1	1,5 ± 1,2	p = ,344 ‡

Anmerkung: Daten sind als prozentualer Anteil (absolute Zahl) oder als M = Mittelwert ± SD = Standardabweichung präsentiert.

† Erfasst zum Zeitpunkt der Erstbefragung; ‡ Student t-Test; # Chi-Quadrat-Test.

<sup>a</sup> Niedrig = kein Schulabschluss, Haupt-/ Volksschule, mittel = Realschule/ Mittlere Reife/ Polytechnische Oberschule 10. Klasse, hoch = Fachhochschulreife/ Abitur/ Allgemeine Hochschulreife.

<sup>b</sup> *European Quality of Life 5 Dimensions 5 Level* Fragebogen Index (Wert: 0 = schlechtester bis 1 = bester Gesundheitszustand) und VAS = visuelle Analogskala (Wert: 0 = schlechtester bis 100 = bester aktueller Gesundheitszustand) [18].

<sup>c</sup> Durchschnittsmenge täglich gerauchter Tabakwaren (inkl. Filterzigaretten, selbstgedrehte/ selbstgestopfte Zigaretten, Zigarren/ Zigarillos, Pfeifen und Shisha).

<sup>d</sup> Gemessen mit der *Verlangen zu Rauchen Skala* (Stufe: 0-5) [21].